

PRESENTASJONSREGLER: BIOTOPER I BARENTSHAVET

DATAEIER

Norges geologiske undersøkelse

STATISK TEGNFORKLARING

BIOTOPER I BARENTSHAVET

-  Varmere vann med middels saltholdighet i middels dype områder.
Blandede, ofte sandholdige sedimenter og sterkere strømmer. Store svamper og boreal fauna.
-  Kaldere vann på middels dyp med noe variasjon i saltholdighet.
Blandede sedimenter. Polarfrontfauna med pigghuder og krepsdyr.
-  Grunt til middels dyp vann med varierende temperatur og saltholdighet.
Slam- og sandholdige sedimenter. Gruntvanns- og bankfauna med krepsdyr, kråkeboller, sjøstjerner og sjøanemoner.
-  Varmere dypt vann med middels saltholdighet.
Blandede slam- og sandholdige sedimenter. Sjøpølser, svamper, sjøstjerner.
-  Middels dype områder med varmere vann med middels saltholdighet.
Blandede slamholdige sedimenter. Svamper og sjøpølser.
-  Kaldere vann på middels dyp med middels saltholdighet.
Slamholdige sedimenter. Dypvannsfauna med polychaetes og snøkrabber.
-  Grunne områder med varierende temperaturer. Store sesongvariasjoner.
Blandede, ofte sandholdige sedimenter. Bankfauna med sjøpølser, muslinger og svamper.
-  Kaldere vann på middels dyp med lavere enn middels saltholdighet.
Blandede slamholdige sedimenter. Nordlig samfunn med medusahoder, mosdyr, havstjerner.
-  Kaldere vann med varierende temperaturer og med varierende, tidvis høy saltholdighet i forbindelse med temperatur ved frysepunktet. Middels dybde.
Blandede slamholdige sedimenter. Nordlig samfunn med svamper, kråkeboller, snøkrabber.
-  Kaldeste vann med under gjennomsnittlig saltholdighet på middels dyp.
Blandede, ofte slamholdige sedimenter. Arktisk samfunn med svamper, slangestjerner og medusahoder.

TEGNFORKLARING DETALJER

Marine biotoper

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
Varmere vann med middels saltholdighet i middels dype områder. Blandede, ofte sandholdige sedimenter og sterkere strømmer. Store svamper og boreal fauna.	255 - 235 - 175		Pixel = 1
Kaldere vann på middels dyp med noe variasjon i saltholdighet. Blandede sedimenter. Polarfrontfauna med pigghuder og krepsdyr.	0 - 197 - 255		Pixel = 2
Grunt til middels dyp vann med varierende temperatur og saltholdighet. Slam- og sandholdige sedimenter. Gruntvanns- og bankfauna med krepsdyr, kråkeboller, sjøstjerner og sjøanemoner.	211 - 255 - 190		Pixel = 3



Biotoper i Barentshavet

Varmere dypt vann med middels saltholdighet. Blandede slam- og sandholdige sedimenter. Sjøpølser, svamper, sjøstjerner.	232 - 190 - 255		Pixel = 4
Middels dype områder med varmere vann med middels saltholdighet. Blandede slamholdige sedimenter. Svamper og sjøpølser.	235 - 235 - 0		Pixel = 5
Kaldere vann på middels dyp med middels saltholdighet. Slamholdige sedimenter. Dypvannsfauna med polychaetes og snøkrabber.	0 - 169 - 230		Pixel = 6
Grunne områder med varierende temperaturer. Store sesongvariasjoner. Blandede, ofte sandholdige sedimenter. Bankfauna med sjøpølser, muslinger og svamper.	170 - 255 - 0		Pixel = 7
Kaldere vann på middels dyp med lavere enn middels saltholdighet. Blandede slamholdige sedimenter. Nordlig samfunn med medusahoder, mosdyr, havstjerner.	190 - 232 - 255		Pixel = 8
Kaldere vann med varierende temperaturer og med varierende, tidvis høy saltholdighet i forbindelse med temperatur ved frysepunktet. Middels dybde. Blandede slamholdige sedimenter. Nordlig samfunn med svamper, kråkeboller, snøkrabber.	0 - 230 - 169		Pixel = 9
Kaldeste vann med under gjennomsnittlig saltholdighet på middels dyp. Blandede, ofte slamholdige sedimenter. Arktisk samfunn med svamper, slangestjerner og medusahoder.	115 - 223 - 255		Pixel = 10

KARTLAG I TJENESTEN

Temakart	GetLegend Graphics	Picture	Min.Scale	Max.Scale
NOR_RUS_BarentsSeaWMS Biotopes	URL		0	-

LENKER/ANNET

[SE KART](#)
[DIGITAL KARTOGRAFI](#)